


— 痔のこト。ボラギノール[®]のこト。 —

説明会資料



あま とう
天藤製薬株式会社

2025年11月12日



「痔」は特別な病気？



日本の成人の半数以上が患っている。

男女差、年齢差：ほとんどなし

つまり

非常に身近な病気



夏目漱石



松尾芭蕉



ナポレオン

痔 = ありふれた病気！


恥ずかしい...

人に相談しづらい

自己流

我慢

悪化...



痔の自覚がある人における
薬の利用率

30.1%

※対象：20～60代の男女 931名
(2016年 天藤製薬株式会社の調査より)

つまり

10人に7人が痔を放置



正しい知識


早期治療

1. おしりのしくみ

① 肛門
(= 肛門管)

② 歯状線

③ 直腸粘膜



《歯状線より上》
知覚神経に支配されていない
||
通常痛みを感じない

《歯状線より下》
知覚神経に支配されている
||
小さな傷でも
強い痛みを感じる

④ 肛門上皮


⑤ 静脈叢
そう

1. おしりのしくみ

肛門は複雑な構造と機能を有するデリケートな部位



便の通過などの刺激を受けることにより、
痔となり、様々な症状が起こる




2. 痔の種類

いぼ痔
(痔核)


きれ痔
(裂肛)

痔ろう

MEN



WOMEN




2. 痔の種類：①いぼ痔（痔核）

原因

- ・ 排便時のいきみなどによる肛門への大きな負荷
- ・ 長時間の同じ姿勢による静脈叢のうっ血

症状

出血・痛み・はれなど



2. 痔の種類：①いぼ痔（痔核）


内痔核

- ・ 初期症状では痛みを感じることは少ない
- ・ 赤い鮮血が出ることもある

外痔核

- ・ 強い痛みを伴う
- ・ 出血はほとんどない

歯状線より上・・・
知覚神経に支配されていない



2. 痔の種類：②きれ痔（裂肛）

原因


- ・便秘で硬くなった便
- ・勢いよく出る下痢便による刺激

※男性よりも女性に多い傾向

歯状線より下の肛門上皮が切れる

症状

- ・排便時の強い痛み
- ・少量の出血



2. 痔の種類：③痔ろう

!

薬物治療対象外

!


医師の治療が必要

症状

- ・ 肛門周囲のはれ
- ・ 激しい痛み
- ・ 発熱 (38~39°C)



専門医での受診を推奨



3. ボラギノール®について

大正 10 年に日本で最初の痔疾用剤として発売


Boraginaceae

ボラギン


+

坐剤基剤の
油性的性質を示す

オール



ボラギノール®



3. ボラギノール®について

ステロイド成分を
配合しています

ボラギノール®A シリーズ ■坐剤 ■注入軟膏 ■軟膏

4種の有効成分がはたらいて「いぼ痔」「きれ痔」に伴う痛み・出血・はれ・かゆみに対し、すぐれた効果を発揮します。



ボラギノール®A 坐剤

第2類医薬品



ボラギノール®A 注入軟膏

第2類医薬品



ボラギノール®A 軟膏

第2類医薬品

**プレドニゾン
酢酸エステル**

炎症をおさえ、
出血・はれ・かゆみを
しずめる

リドカイン

患部の感覚を一時的に
麻痺させ、痛みや
かゆみをしずめる

アラントイン

傷の治りをたすけ、
組織を修復する

**ビタミンE酢酸
エステル**

末梢の血液循環をよくし、
いぼ痔・きれ痔に伴う
症状の緩和をたすける

3. ボラギノール[®]について

ステロイド成分を
配合していません

ボラギノール[®]M シリーズ ■坐剤 ■軟膏

4種の有効成分がはたらいて「いぼ痔」「きれ痔」に伴う痛み・かゆみに対し、すぐれた効果を発揮します。

ステロイドを含まない製品をお求めの方にお勧めいただけます。



ボラギノール[®]M 坐剤

第2類医薬品



ボラギノール[®]M 軟膏

第2類医薬品

グリチルレチン酸

生薬の甘草に
由来する抗炎症成分

A シリーズと同成分

リドカイン

アラントイン

ビタミンE酢酸
エステル

3. ボラギノール®について

内服ボラギノール®EP ■内服薬

3種の生薬エキスを配合した痔疾用内服薬



内服ボラギノール®EP

第2類医薬品


ボタンピ°



ボタンピ
エキス

血液循環を改善し、
炎症をおさえる

セイヨウトチノキの種子



セイヨウトチノキ
種子エキス

血液循環を改善し、
炎症をおさえる

シコン



シコン水製
エキス

炎症をおさえる

のみやすくて溶けやすい顆粒剤



3. ボラギノール[®]について

内服 ボラギノール[®]EX ■内服薬

痔の症状と原因の改善、その両方を追求した内服薬



内服ボラギノール[®]EX

第2類医薬品

サイコ・カンゾウ・ショウマ



抗炎症作用

患部の炎症を鎮め、
出血を緩和する

トウキ・トウニン・コウカ



鎮痛作用

痛みや痒みを鎮める

血流改善

痔の原因となる
うっ血改善

ダイオウ・オウバク
ソウジュツ・チンピ



おもいやり設計

現代人のライフスタイルに合わせた配合

のみやすく持ち運びにも便利な個包装の錠剤タイプ

4. おしりの症状で使い分けるボラギノール®シリーズ

1. 注入軟膏について

肛門内側・外側の**いぼ痔**や**きれ痔**に使用



ボラギノール®A 注入軟膏

第2類医薬品



内側には注入




外側には塗布

4. おしりの症状で使い分けるボラギノール®シリーズ

おしりにやさしい容器設計 3つのポイント

ポイント
1


ノズルの長さは
26 mm



ポイント
2


ノズルの直径は
6 mm

ノズル直径
6mm



ポイント
3


先端は
丸いカーブ



4. おしりの症状で使い分けるボラギノール®シリーズ


使いやすさのワケ

その1



衛生的

その2



保管も簡単

その3



外出・旅行など
にも便利

4. おしりの症状で使い分けるボラギノール®シリーズ

2. 坐剤について

主に**肛門内側のいぼ痔**に使用



ボラギノール®A坐剤

第2類医薬品



ボラギノール®M坐剤

第2類医薬品




肛門を清潔にした後、坐剤の底をもって先の方から挿入し、坐剤全体が肛門内に入るまで指で十分に押し込みます。

4. おしりの症状で使い分けるボラギノール®シリーズ

2. 坐剤について


肛門内側のいぼ痔は **2～3か所発生**している場合や
きれ痔を併発している場合があります。



**体温ですみやかに溶けて患部全体に拡がり、
薬剤を直接作用させるように設計**

4. おしりの症状で使い分けるボラギノール®シリーズ

ボラギノールの《トリプル作用》



4. おしりの症状で使い分けるボラギノール®シリーズ

油脂性基剤「ハードファット」



基剤の油が傷ついた患部を保護
スムーズな排便をたすける




4. おしりの症状で使い分けるボラギノール®シリーズ

ボラギノールの保管

正しい方向で
保管すると…

溶融



変形しない

横向きで
保管すると…


溶融



側面が変形

上下逆で
保管すると…

溶融




先端が変形

4. おしりの症状で使い分けるボラギノール®シリーズ

坐剤の変形を防ぐには？

ポイント
1



陽射しを避け、
1～30℃の範囲内で保管

ポイント
2



1～30℃の
涼しい場所で保管

ポイント
3



マークのとおり、
立てた状態で保管

4. おしりの症状で使い分けるボラギノール®シリーズ

3. 軟膏について

主に**肛門外側のいぼ痔やきれ痔**に使用




ボラギノール[®]A軟膏

第2類医薬品




ボラギノール[®]M軟膏

第2類医薬品



直接
塗布



ガーゼなどに
伸ばして
貼付

4. おしりの症状で使い分けるボラギノール®シリーズ

4. 内服薬について

直腸肛門部の血液循環障害を改善
炎症をおさえ、痛み・出血・はれ・かゆみなどの症状を改善



内服ボラギノール®EX

第2類医薬品



内服ボラギノール®EP

第2類医薬品


4. おしりの症状で使い分けるボラギノール®シリーズ

5. ボラギノールシリーズ住み分けについて

	製品カテゴリ	医薬品	
	目的	対処	体質改善
胃腸機能環境改善 (便通改善)			
血流改善			内服ボラギノールEX
抗炎症 免疫・皮膚力向上	ボラギノール A、M	内服ボラギノール EP	内服ボラギノール EX

5. 接客のポイント

《 店頭でお客様が購入をためらわれている場合 》



痔の薬を買うのって
抵抗があって・・・

痔を患っている方は
よくお店に
いらっしゃいますよ




恥ずかしさや抵抗感の払拭

早めの対処

5. 接客のポイント

《 坐剤の使い方がわからない場合 》



坐剤って、
どう使ったらいいか
わからないんですが・・・

そんなに
難しくはありませんよ



①手を洗う


②排便後に肛門を清潔にする

③坐剤の底を持って先のほうから挿入

④坐剤が全部肛門内に入るまで
指で十分に押し込む

5. 接客のポイント

《お風呂に関する質問を受けた場合》



お風呂は
普通に入っても大丈夫？

患部が清潔に保てますし、
血行がよくなるので
お風呂はよいですよ



お風呂はぬるめで
ゆっくりつかることをお勧めしましょう。
(痔ろうの場合は除く)

5. 接客のポイント

生活習慣改善のためのワンポイントアドバイス

①




お風呂はぬるめの湯船に
ゆっくりつかる
(痔ろうの場合は除く)

②



トイレは3~5分を目安に、
無理に出そうとしない

③



便秘や下痢にならないように
食生活に気をつける

5. 接客のポイント


生活習慣改善のためのワンポイントアドバイス

④




1日3食
バランスよく食べる

⑤



無理な**ダイエット**は
しない

⑥




同じ姿勢を続けない

ご注意!

ボラギノール[®]シリーズは

15歳以上の方が対象





- 外用薬を使い始めて10日間又は
内服薬を服用してから1ヵ月経過しても
症状の改善が見られない場合

- 痔ろうの場合

➡ 専門医での受診を推奨



ボラギノール[®]

ご清聴ありがとうございました。
ございました。