

痔のこト。ボラギノール®のこト。

説明会資料

 天藤製薬株式会社

2025年11月12日



「痔」は特別な病気？



日本の成人の半数以上が患っている。

男女差、年齢差：ほとんどなし

つまり

非常に身近な病気



夏目漱石



松尾芭蕉



ナポレオン

痔 = ありふれた病気！

恥ずかしい…

人に相談しづらい

自己流 我慢

悪化…

薬を利用している 30.1% ※

痔の自覚がある人における薬の利用率 30.1%

※対象：20～60代の男女 931名 (2016年 天藤製薬株式会社の調査より)

つまり → **10人に7人が痔を放置**

潜在需要

正しい知識 早期治療

1. おしりのしくみ

① 肛門 (= 肛門管)

② 歯状線

③ 直腸粘膜

④ 肛門上皮

⑤ 静脈叢

そう

《歯状線より上》
知覚神経に支配されていない
通常痛みを感じない

《歯状線より下》
知覚神経に支配されている
小さな傷でも強い痛みを感じる

1. おしりのしくみ

肛門は複雑な構造と機能を有するデリケートな部位

さらに

便の通過などの刺激を受けることにより、痔となり、様々な症状が起こる

うっ血


切れる

2. 痔の種類

いぼ痔
(痔核)

きれ痔
(裂肛)

痔ろう



出典：【1960年～2004年 社会保険中央総合病院・大腸肛門病センター症例】 寺本龍生 編（2007）「肛門部疾患診療最前線」株式会社診断と治療社


2. 痔の種類：①いぼ痔（痔核）

原因

- ・排便時のいきみなどによる肛門への大きな負荷
- ・長時間の同じ姿勢による静脈叢のうっ血

症状

出血・痛み・はれなど




2. 痔の種類：①いぼ痔（痔核）

内痔核

- ・初期症状では痛みを感じることは少ない
- ・赤い鮮血が出ることがある

歯状線より上・・・
知覚神経に支配されていない



外痔核

- ・強い痛みを伴う
- ・出血はほとんどない

歯状線より下・・・
知覚神経に支配されている

2. 痔の種類：②きれ痔（裂肛）

原因


- ・便秘で硬くなった便
- ・勢いよく出る下痢便による刺激

※男性よりも女性に多い傾向

歯状線より下の肛門上皮が切れる

症状

- ・排便時の強い痛み
- ・少量の出血



きれ痔


2. 痔の種類：③痔ろう

! 薬物治療対象外

! 医師の治療が必要

症状

- ・ 肛門周囲のはれ
- ・ 激しい痛み
- ・ 発熱 (38~39°C)



専門医での受診を推奨

3. ボラギノール®について

大正 10 年に日本で最初の痔疾用剤として発売

Boraginaceae + 坐剤基剤の油性的性質を示す

ボラギン + **オール**

ボラギノール®



3. ボラギノール®について

ステロイド成分を配合しています

ボラギノール®A シリーズ ■坐剤 ■注入軟膏 ■軟膏

4種の有効成分がはたらいて「いぼ痔」「きれ痔」に伴う痛み・出血・はれ・かゆみに対し、すぐれた効果を発揮します。



ボラギノール®A 坐剤
第2類医薬品



ボラギノール®A 注入軟膏
第2類医薬品



ボラギノール®A 軟膏
第2類医薬品

プレドニゾロン
酢酸エステル

炎症をおさえ、
出血・はれ・かゆみを
しずめる

リドカイン

患部の感覚を一時的に
麻痺させ、痛みや
かゆみをしずめる

アラントイン

傷の治りをたすけ、
組織を修復する

ビタミンE酢酸
エステル

末梢の血液循環をよくし、
いぼ痔・きれ痔に伴う
症状の緩和をたすける

3. ボラギノール®について

ステロイド成分を配合していません

ボラギノール®M シリーズ ■坐剤 ■軟膏

4種の有効成分がはたらいて「いぼ痔」「きれ痔」に伴う痛み・かゆみに対し、すぐれた効果を発揮します。

ステロイドを含まない製品をお求めの方にお勧めいただけます。



ボラギノール®M 坐剤
第2類医薬品



ボラギノール®M 軟膏
第2類医薬品

グリチルレチン酸

生薬の甘草に
由来する抗炎症成分

A シリーズと同成分

リドカイン

アラントイン

ビタミンE酢酸
エステル

3. ボラギノール®について

内服ボラギノール®EP ■内服薬

3種の生薬エキスを配合した痔疾用内服薬



内服ボラギノール®EP
第2類医薬品

ポタンピ



ポタンピエキス
血液循環を改善し、
炎症をおさえる

セイヨウトチノキの種子



セイヨウトチノキ
種子エキス
血液循環を改善し、
炎症をおさえる

シコン



シコン水製
エキス
炎症をおさえる

のみやすくて溶けやすい顆粒剤

NEW

3. ボラギノール®について

内服ボラギノール®EX ■内服薬

痔の症状と原因の改善、その両方を追求した内服薬



内服ボラギノール®EX
第2類医薬品

サイコ・カンゾウ・ショウマ



抗炎症作用
患部の炎症を鎮め、
出血を緩和する

トウキ・トウニン・コウカ



鎮痛作用
痛みや痒みを鎮める

ダイオウ・オウバク
ソウジュツ・チンピ



血流改善
痔の原因となる
うっ血改善

おもいやり設計
現代人のライフスタイルに合わせた配合

のみやすく持ち運びにも便利な個包装の錠剤タイプ

4. おしりの症状で使い分けるボラギノール®シリーズ

1. 注入軟膏について

肛門内側・外側のいぼ痔やきれ痔に使用



ボラギノール®A注入軟膏
第2類医薬品



内側には注入



外側には塗布

4. おしりの症状で使い分けるボラギノール®シリーズ


おしりにやさしい容器設計 3つのポイント

ポイント
1

ノズルの長さは
26 mm

ポイント
2

ノズルの直径は
6 mm



ポイント
3

先端は
丸いカーブ



4. おしりの症状で使い分けるボラギノール®シリーズ

使いやすさのワケ

その1



衛生的

その2



保管も簡単

その3



外出・旅行などにも便利

21

4. おしりの症状で使い分けるボラギノール®シリーズ

2. 坐剤について

主に**肛門内側のいぼ痔**に使用



ボラギノール[®]A坐剤

第2類医薬品



ボラギノール[®]M坐剤

第2類医薬品




肛門を清潔にした後、坐剤の底をもって先の方から挿入し、坐剤全体が肛門内に入るまで指で十分に押し込みます。

22

4. おしりの症状で使い分けるボラギノール®シリーズ

2. 坐剤について

肛門内側のいぼ痔は**2～3か所**発生している場合や**きれ痔**を併発している場合があります。




体温ですみやかに溶けて患部全体に拡がり、
薬剤を直接作用させるように設計

23

4. おしりの症状で使い分けるボラギノール®シリーズ

ボラギノールの《トリプル作用》



挿入直後
止まって

溶融中
溶けて

溶融後
拡がる

24

4. おしりの症状で使い分けるボラギノール®シリーズ

油脂性基剤「ハードファット」



基剤の油が傷ついた患部を保護
スムーズな排便をたすける



4. おしりの症状で使い分けるボラギノール®シリーズ

ボラギノールの保管



4. おしりの症状で使い分けるボラギノール®シリーズ

坐剤の変形を防ぐには？

ポイント 1: 陽射しを避け、1~30°C の範囲内で保管

ポイント 2: 1~30°C の 涼しい場所で保管

ポイント 3: マークのとおり、立てた状態で保管

4. おしりの症状で使い分けるボラギノール®シリーズ

3. 軟膏について

主に肛門外側のいぼ痔やきれ痔に使用

ボラギノール[®]A軟膏 (第2類医薬品)

ボラギノール[®]M軟膏 (第2類医薬品)

直接塗布

ガーゼなどに伸ばして貼付

4. おしりの症状で使い分けるボラギノール®シリーズ

4. 内服薬について

直腸肛門部の血液循環障害を改善
炎症をおさえ、痛み・出血・はれ・かゆみなどの症状を改善



内服ボラギノールEX

第2類医薬品



内服ボラギノールEP

第2類医薬品

29

4. おしりの症状で使い分けるボラギノール®シリーズ

5. ボラギノールシリーズ住み分けについて

	製品カテゴリ	医薬品	
	目的	対処	体質改善
胃腸機能環境改善 (便通改善)			
血流改善			
抗炎症 免疫・皮膚力向上			

ボラギノール A、M (緑)

内服ボラギノール EP (赤)

内服ボラギノール EX (紫)

30

5. 接客のポイント

《 店頭でお客様が購入をためらわれている場合 》

痔の薬を買うのって抵抗があって・・・

痔を患っている方はよくお店にいらっしゃいますよ



恥ずかしさや抵抗感の払拭

早めの対処

31

5. 接客のポイント

《 坐剤の使い方がわからない場合 》

坐剤って、どう使ったらいいかわからないんですが・・・

そんなに難しくありませんよ



①手を洗う

②排便後に肛門を清潔にする

③坐剤の底を持って先のほうから挿入

④坐剤が全部肛門内に入るまで指で十分に押し込む

32

5. 接客のポイント

《お風呂に関する質問を受けた場合》

お風呂は
普通に入っても大丈夫？

患部が清潔に保てますし、
血行がよくなるので
お風呂はよいですよ

お風呂はぬるめで
ゆっくりつかることをお勧めしましょう。
(痔ろうの場合は除く)



33

5. 接客のポイント

生活習慣改善のためのワンポイントアドバイス

①



お風呂はぬるめの湯船に
ゆっくりつかる
(痔ろうの場合は除く)

②



トイレは3~5分を目安に、
無理に出そうとしない

③



便秘や下痢にならないように
食生活に気をつける

34

5. 接客のポイント

生活習慣改善のためのワンポイントアドバイス

④



1日3食
バランスよく食べる

⑤



無理なダイエットは
しない

⑥



同じ姿勢を続けない

35


ご注意!

ボラギノール[®]シリーズは

15歳以上の方が対象



36



- 外用薬を使い始めて10日間又は
内服薬を服用してから1ヵ月経過しても
症状の改善が見られない場合

- 痔ろうの場合

➡ 専門医での受診を推奨

37



ボラギノール®

ご清聴ありがとうございました。

 天藤製薬株式会社